

2° TEST DI AUTOVALUTAZIONE (VERO O FALSO)

a) L'Amanita verna e l'Amanita virosa sono meno pericolose della phalloide.	V	F
b) Il Cortinarius orellanus non è un fungo mortale.	V	F
c) L'Entoloma lividum è un fungo a bassa tossicità.	V	F
d) L'ingestione dell'Amanita phalloide provoca una sindrome a breve incubazione	V	F
e) L'avvelenamento da Amanita phalloide provoca lesioni gravissime ai reni	V	F
f) L'ingestione del Paxillus involutus provoca gastroenterite acuta e insufficienza renale	V	F
g) L'ingestione dell'Amanita muscaria provoca una sindrome panterina	V	F
h) Tutti i funghi di prato sono commestibili	V	F
i) Tutti i funghi che nascono sui tronchi degli alberi sono commestibili	V	F
j) I funghi hanno un'elevata capacità di assorbire e accumulare inquinanti	V	F
k) Il Boletus edulis (porcino) appartiene alle specie "molto accumulatrici" di cadmio e piombo	V	F
l) I funghi non assorbono pesticidi	V	F
m) L'Armillaria mellea è una specie non "accumulatrice"	V	F
n) Le Morchelle contengono tossine termolabili (che vengono eliminate con cottura di almeno 20 minuti)	V	F